

N'oubliez pas d'emporter pour chaque dispensation :

- Pièce d'identité
- Carte vitale ou attestation de droits sécurité sociale en cours de validité
- Prise en charge mutuelle

A chaque dispensation, merci de vous munir de **l'original de votre ordonnance valide**.

Ma pharmacie : _____

N° de téléphone : _____

Adresse : _____

Mon médecin traitant : _____

N° de téléphone : _____

Adresse : _____

Ce document ne remplace pas la notice de votre médicament que vous devez lire attentivement avant de prendre votre médicament car elle contient des informations complémentaires importantes pour vous.



EFFEXOR LP[®] ou générique

Venlafaxine (chlorhydrate de)
37,5 mg, 75 mg et 150 mg
Gélule à libération prolongée

Médicament disponible en pharmacie de ville
Générique disponible*

- Chlorhydrate de venlafaxine 37,5 mg ou 75 mg, gélule à libération prolongée :

Effexor LP[®], Venlafaxine Almus LP[®], Venlafaxine Alter LP[®],
Venlafaxine Arrow LP[®], Venlafaxine Biogaran LP[®],
Venlafaxine Bluefish LP[®], Venlafaxine Cisters LP[®],
Venlafaxine EG LP[®], Venlafaxine Evolugen LP[®], Venlafaxine KRKA LP[®],
Venlafaxine Mylan LP[®], Venlafaxine Ranbaxy LP[®],
Venlafaxine Sandoz LP[®], Venlafaxine Teva Santé LP[®],
Venlafaxine Zentiva LP[®], Venlafaxine Zydus LP[®].

- Chlorhydrate de venlafaxine 150 mg, gélule à libération prolongée :

Venlafaxine Arrow LP[®],
Venlafaxine Ranbaxy LP[®].

Qu'est ce que la VENLAFAXINE ? Dans quel cas est-elle utilisée ?

La VENLAFAXINE est un médicament **antidépresseur**.
Votre médecin vous l'a prescrit pour son efficacité dans le **traitement de la cataplexie** (perte du tonus musculaire au rire).



Comment prendre la VENLAFAXINE dans la narcolepsie ?

La dose habituelle est de **37,5 mg à 225 mg en une à deux prises par jour**.

Prenez les gélules **au cours d'un repas si possible à heure fixe**.



Les gélules doivent être avalées avec un peu de liquide, **et ne doivent être ni ouvertes, ni écrasées, ni croquées ou dissoutes**.



En cas d'oubli de prise ou de vomissement :
prenez-la dès que vous vous en apercevez.
Ne prenez pas plus que la posologie qui vous a été prescrite pour une journée.

Comment conserver la VENLAFAXINE ?

Conservez à **température ambiante** (<30°C)

Ne prenez jamais la VENLAFAXINE dans les cas suivants :



- Allergie à la VENLAFAXINE ou à un des composants
- Nouveau-nés et nourrissons.






Grossesse : Vous ne devez utiliser la venlafaxine qu'après avoir discuté des bénéfices et des risques potentiels pour votre enfant à naître avec votre médecin.

Allaitement : En raison du passage du médicament dans le lait maternel, **vous ne devez pas allaiter** sauf si cela est vraiment nécessaire.

Demandez TOUJOURS l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de grossesse ou d'allaitement.

N'arrêtez JAMAIS le traitement ou ne modifiez JAMAIS le rythme d'administration sans l'avis de votre médecin car il existe un risque de rebond de cataplexie et d'hallucinations en cas d'arrêt brutal.

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Classification organique	Type d'effet ressenti	Conduite à tenir
Neuropsychiatrique 	Céphalées, insomnie, fatigue, irritabilité	Attention à l'effet conjoint avec l'alcool. Evitez les médicaments pouvant provoquer étourdissements ou confusion.
Digestif 	Nausées ou vomissements	Buvez entre les repas. Evitez les aliments frits, gras ou épicés. Mangez lentement. Faites plusieurs petits repas légers.
	Sécheresse buccale	Humidifiez vous la bouche avec un vaporisateur. Buvez beaucoup d'eau.
Métabolique 	Hypersudation (nocturne le plus souvent) Perte d'appétit	Parlez en à votre médecin



Si vous ressentez un effet indésirable, qu'il soit précisé ou non dans la notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Utilisation d'autres médicaments :

La venlafaxine **ne doit pas être utilisée** avec :

- Un **antidépresseur de type IMAO** : iproniazide,
- Le **linézolide** (antibiotique).

D'autres médicaments peuvent interagir avec la venlafaxine **et doivent être utilisés avec prudence**

- Le **kétoconazole** (un médicament contre les mycoses),
- L'**halopéridol** ou la **rispéridone** (pour traiter certains troubles psychiatriques),
- Le **métoprolol** (utilisé pour traiter l'hypertension artérielle et certains problèmes cardiaques).

Si vous prenez d'autres médicaments sans ordonnance ou à base de plantes ou compléments alimentaires, parlez en à votre médecin ou à votre pharmacien.

