

N'oubliez pas d'apporter pour chaque dispensation :

- Pièce d'identité
- Carte vitale ou attestation de droits sécurité sociale en cours de validité
- Prise en charge mutuelle

A chaque dispensation, merci de vous munir de l'original de prescription sécurisée hospitalière valide **datant de moins de 3 jours**. Au-delà de 3 jours, votre pharmacien vous délivrera uniquement la quantité de médicament correspondant à la durée restante de votre prescription.

Prenez contact avec votre pharmacie hospitalière avant la première dispensation afin de connaître :

- La **disponibilité du produit**
- Les **modalités administratives** pour la création du dossier de facturation (un passage par le bureau des admissions est parfois nécessaire avant la première dispensation)

Ma pharmacie hospitalière : _____

N° de téléphone : _____

Adresse : _____

Mon médecin traitant : _____

N° de téléphone : _____

Adresse : _____

Ce document ne remplace pas la notice de votre médicament que vous devez lire attentivement avant de prendre votre médicament car elle contient des informations complémentaires importantes pour vous.

Fiche réalisée par la Pharmacie Centrale des Hospices Civils de Lyon
Version : Mars 2019



ATTENTIN® Dexamphétamine 5mg comprimé

Médicament STUPEFIANT
Prescription hospitalière limitée à 28 jours
ATU* Nominative
Médicament disponible en pharmacie hospitalière



* L'Autorisation Temporaire d'Utilisation permet la mise à disposition exceptionnelle d'un médicament ne disposant pas d'autorisation de mise sur le marché (AMM) français.










Qu'est ce que ATTENTIN® ? Dans quel cas est-il utilisé ?

ATTENTIN® atténue la somnolence et stimule l'activité mentale.



ATTENTIN® vous a été prescrit pour : une somnolence excessive dans la journée dans le cadre d'une narcolepsie ou d'une hypersomnie idiopathique, résistant aux autres traitements

Comment prendre ATTENTIN® ?

Matin 	Midi 	soir 
		
		

La dose est comprise entre 10 et 60 mg par jour. Elle est adaptée par votre médecin en fonction de votre besoin. Prenez ATTENTIN® au cours d'un repas avec un verre d'eau, ne croquez pas.

Évitez les prises après 14 h qui pourraient limiter l'endormissement.



En cas d'oubli de prise : Prenez la dose oubliée dès que vous vous en apercevez mais pas après 14h et respectez un intervalle minimum de 4h entre 2 prises,

Conduite de véhicule : La dexamphétamine peut masquer un état de grande fatigue, soyez très vigilants.

Contraception : La mise en place d'un moyen de contraception efficace est nécessaire.

Sport : La dexamphétamine est inscrite sur la liste des substances dopantes.

Ne prenez jamais ATTENTIN® dans les cas suivants :






- Allergie à la dexamphétamine, à l'un des autres composants ou aux amines sympathomimétiques,
- Glaucome (augmentation de la pression intérieure de l'œil),
- Phéochromocytome (tumeur à l'origine d'une augmentation de la tension artérielle),
- Maladie cardiovasculaire ou hypertension de l'artère pulmonaire
- Hyperthyroïdie
- Troubles psychotiques, tics moteurs, propension aux abus médicamenteux, alcoolisme (augmentation du risque de dépendance),
- Porphyrie, maladie du foie ou du rein sévères.



Grossesse, allaitement : ATTENTIN® ne doit pas être pris pendant la grossesse ou l'allaitement.

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Classification organique	Type d'effet ressenti	Conduite à tenir
Neuropsychiatrique 	Vertiges, étourdissements, Hyperréactivité, nervosité, insomnie, troubles de l'humeur	Évitez les médicaments pouvant provoquer étourdissements ou confusion et l'alcool. Un bilan psychiatrique est réalisé en début de traitement.
Digestif (Apparition généralement au début du traitement ; La prise du médicament au cours d'un repas diminue ces symptômes.) 	Perte d'appétit	Mangez les aliments que vous aimez et essayez de prendre régulièrement des petits repas.
	Sécheresse buccale	Humidifiez la bouche avec un vaporisateur. Buvez beaucoup d'eau.
	Nausées ou vomissements	Buvez entre les repas. Évitez les aliments frits, gras ou épicés. Mangez lentement. Faites plusieurs petits repas légers.
Cardio-vasculaire 	Constipation	Augmentez les apports en fibres (légumes verts), évitez les sucres lents (pâtes, riz, pain). Buvez beaucoup d'eau.
	Troubles du rythme cardiaque, augmentation de la tension et de la fréquence cardiaque	Surveillance clinique régulière (tous les 3 mois la 1 ^{ère} année puis tous les 6 mois). En cas de signes inhabituels prévenez votre médecin traitant rapidement afin d'effectuer un bilan cardiaque,
Syndrome de manque	État de malaise douloureux, un état de manque, insomnie, hypersomnie...	N'arrêtez pas brutalement le traitement.



Si vous ressentez un effet indésirable, qu'il soit précisé ou non dans la notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien

Comment conserver ATTENTIN® ?

Conservez à température ambiante (entre 15 et 30°C), dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Utilisation d'autres médicaments



Certains médicaments peuvent interagir avec ATTENTIN®, il est nécessaire de prévenir votre médecin ou votre pharmacien des autres médicaments que vous prenez.

Si vous prenez un autre médicament obtenu sans ordonnance, un complément alimentaire, ou un traitement extrait de plantes, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.