

N'oubliez pas d'emporter pour chaque dispensation :

- Pièce d'identité
- Carte vitale ou attestation de droits sécurité sociale en cours de validité
- Prise en charge mutuelle

A chaque dispensation, merci de vous munir de l'**original** de votre ordonnance valide.

Ma pharmacie : _____

N° de téléphone : _____

Adresse : _____

Mon médecin traitant : _____

N° de téléphone : _____

Adresse : _____

Ce document ne remplace pas la notice de votre médicament que vous devez lire attentivement avant de prendre votre médicament car elle contient des informations complémentaires importantes pour vous.

Fiche réalisée par la Pharmacie Centrale des Hospices Civils de Lyon
Version : Mars 2019



ANAFRANIL® ou générique Clomipramine (chlorhydrate de)

**Médicament disponible en pharmacie de ville
Générique disponible***

- **Chlorhydrate de clomipramine 10 mg, comprimé enrobé :**
Anafranil®,
Clomipramine Sandoz®.
- **Chlorhydrate de clomipramine 25 mg, comprimé enrobé :**
Anafranil®,
Clomipramine Mylan®,
Clomipramine Sandoz®.
- **Chlorhydrate de clomipramine 75 mg, comprimé pelliculé sécable:**
Anafranil®,
Clomipramine Mylan®,
Clomipramine Sandoz®.

* Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM)
- Répertoire des médicaments génériques. www.ansm.sante.fr

Qu'est ce que la CLOMIPRAMINE? Dans quel cas est-elle utilisée ?

La clomipramine est un médicament **antidépresseur**.
Votre médecin vous l'a prescrit pour son efficacité dans **le traitement de la cataplexie (perte du tonus musculaire au rire)**.

Comment prendre la CLOMIPRAMINE dans la narcolepsie ?

La dose habituelle est de **10 mg à 75 mg par jour**.



Prenez ce médicament **avec un verre d'eau, en cours ou en dehors d'un repas**.



En cas d'oubli de prise ou de vomissement :

Prenez la dose suivante à l'heure habituelle.

Ne prenez JAMAIS deux fois la dose pour compenser la dose oubliée.

Comment conserver la CLOMIPRAMINE ?

Conservez **à température ambiante**

Ne prenez jamais la CLOMIPRAMINE dans les cas suivants :



- Allergie à la clomipramine ou à l'un des autres composants,
- Risque connu de **glaucome** (augmentation de la pression intérieure de l'œil),
- En cas de **difficulté pour uriner** (problème prostatique ou autre),
- **Infarctus du myocarde récent**,
- Utilisation **contre-indiqué chez les nouveau-nés et les nourrissons**.



Grossesse : dans les conditions normales d'utilisation, ce médicament **peut être utilisé**.




Allaitement : il est préférable **d'éviter l'allaitement** lors du traitement (faible passage du médicament dans le lait maternel).

Demandez TOUJOURS l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de grossesse ou d'allaitement.



N'arrêtez JAMAIS le traitement ou ne modifiez JAMAIS le rythme d'administration sans l'avis de votre médecin car il existe un risque de rebond de cataplexie et d'hallucinations en cas d'arrêt brutal.

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Classification organique	Type d'effet ressenti	Conduite à tenir
Neuropsychiatrique 	Céphalées, insomnie, fatigue, irritabilité	Attention à l'effet conjoint avec l'alcool. Evitez les médicaments pouvant provoquer étourdissements ou confusion.
Digestif 	Sécheresse buccale	Humidifiez vous la bouche avec un vaporisateur. Buvez beaucoup d'eau.
	Constipation	Augmentez les apports en fibres (légumes verts), évitez les sucres lents (pâtes, riz, pain). Buvez beaucoup d'eau.
Métabolique	Prise de poids	Informez votre médecin en cas d'apparition de ces symptômes
Cardiaque 	Hypotension orthostatique (sensation d'étourdissement lors du passage de la position couchée ou assise à debout)	Informez votre médecin en cas d'apparition de ces symptômes
Sexuel	Perte de libido, impuissance	Informez votre médecin en cas d'apparition de ces symptômes



Si vous ressentez un effet indésirable, qu'il soit précisé ou non dans la notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Utilisation d'autres médicaments :



La clomipramine **ne doit pas être utilisée** avec l'**iproniazide** (antidépresseurs). **Un délai de 2 semaines doit être respecté** entre l'arrêt de l'iproniazide et l'instauration de clomipramine ou d'**une semaine** entre l'arrêt de la clomipramine et l'instauration d'iproniazide.

Le risque d'avoir un effet indésirable peut être augmenté avec :

- certains antidépresseurs (**moclobemide**),
- certains médicaments du système cardio-vasculaire (**clonidine**),
- un antibiotique (**linezolid**).

Si vous prenez d'autres médicaments sans ordonnance ou à base de plantes ou de compléments alimentaires, parlez en à votre médecin ou à votre pharmacien.