

N'oubliez pas d'emporter pour chaque dispensation :

- Pièce d'identité
- Carte vitale ou attestation de droits sécurité sociale en cours de validité
- Prise en charge mutuelle

A chaque dispensation, merci de vous munir de **l'original de votre ordonnance valide**.

Ma pharmacie : _____

N° de téléphone : _____

Adresse : _____

Mon médecin traitant : _____

N° de téléphone : _____

Adresse : _____

Ce document ne remplace pas la notice de votre médicament que vous devez lire attentivement avant de prendre votre médicament car elle contient des informations complémentaires importantes pour vous.

Fiche réalisée par la Pharmacie Centrale des Hospices Civils de Lyon
Version : Mars 2019



PROZAC® ou générique Fluoxétine (chlorhydrate de)

**Médicament disponible en pharmacie de ville
Générique disponible***

- Chlorhydrate de fluoxétine 20 mg, comprimé dispersible sécable :

Prozac®, Fluoxétine Arrow®, Fluoxétine Biogaran®, Fluoxétine Cristers®,
Fluoxétine EG®, Fluoxétine Mylan®, Fluoxétine Sandoz®,
Fluoxétine Teva Santé®, Fluoxétine Zentiva®, Fluoxétine Zydus®.

- Chlorhydrate de fluoxétine 20 mg, gélule :

Prozac®, Fluoxétine Accord®, Fluoxétine Almus®, Fluoxétine Alter,
Fluoxétine Arrow®, Fluoxétine Biogaran®, Fluoxétine Cristers®,
Fluoxétine EG®, Fluoxétine LBR, Fluoxétine Mylan®,
Fluoxétine Ranbaxy®, Fluoxétine Sandoz®, Fluoxétine Teva Santé,
Fluoxétine Zentiva®, Fluoxétine Zydus®.

- Chlorhydrate de fluoxétine 20 mg/5ml, solution buvable :

Prozac®,
Fluoxétine Arrow®,
Fluoxétine Biogaran®.

* Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM)
- Répertoire des médicaments génériques. www.ansm.sante.fr

Qu'est ce que la FLUOXETINE ? Dans quel cas est-elle utilisée ?

La fluoxétine est un médicament **antidépresseur**.
Votre médecin vous l'a prescrit pour son efficacité dans **le traitement de la cataplexie (perte du tonus musculaire au rire)**.


Comment prendre la FLUOXETINE dans la narcolepsie ?

La dose habituelle est de **20 mg à 60 mg par jour en une ou plusieurs prises pendant ou en dehors des repas**.

Comprimé dispersible : avalez de préférence avec un peu d'eau. **Ne croquez pas le comprimé.**

Gélule : à avaler avec un verre d'eau. **Ne mâchez pas la gélule.**

Solution buvable : utilisez la pipette doseuse fournie avec la boîte, versez la dose dans un verre ou une cuillère.

 **En cas d'oubli de prise ou de vomissement** :
Prenez la dose suivante à l'heure habituelle.
Ne prenez JAMAIS deux fois la dose pour compenser la dose oubliée.


Comment conserver la FLUOXETINE ?

Conservez à **température ambiante (<30°C)**

Ne prenez jamais la FLUOXETINE dans les cas suivants :



Allergie à la fluoxétine ou à un des autres composants



 **Grossesse** : il est préférable de ne pas prendre de la fluoxétine pendant la grossesse, sauf si les bénéfices attendus sont supérieurs aux risques potentiels.

Allaitement : En raison du passage du médicament dans le lait maternel, **vous ne devez pas allaiter** sauf si cela est vraiment nécessaire.

 **Demandez TOUJOURS l'avis de votre médecin** ou de votre pharmacien en cas de grossesse ou d'allaitement.

N'arrêtez JAMAIS le traitement ou ne modifiez jamais le rythme d'administration sans l'avis de votre médecin car il existe un risque de rebond de cataplexie et d'hallucinations en cas d'arrêt brutal.

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Classification organique	Type d'effet ressenti	Conduite à tenir
Neuropsychiatrique 	Céphalées, insomnie, fatigue	Attention à l'effet conjoint avec l'alcool. Evitez les médicaments pouvant provoquer étourdissements ou confusion.
Digestif 	Diarrhées	Evitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool.
	Constipation	Augmentez les apports en fibres (légumes verts), évitez les sucres lents (pâtes, riz, pain). Buvez beaucoup d'eau.



Si vous ressentez un effet indésirable, qu'il soit précisé ou non dans la notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien

Utilisation d'autres médicaments



La fluoxétine **ne doit pas être utilisée** avec :

- Un antidépresseur appelé **iproniazide**
- Un médicament appelé **métoprolol** utilisé dans l'insuffisance cardiaque

Le risque d'avoir un effet indésirable peut être augmenté avec d'autres médicaments tels que le **moclobemide** (antidépresseur), le **linezolid** (antibiotique)

La fluoxétine peut modifier le mode de fonctionnement d'autres médicaments utilisés contre l'épilepsie (**phénytoïne**), contre l'allergie (**méquitazine**).

Si vous prenez d'autres médicaments avec ou sans ordonnance ou à base de plantes ou compléments alimentaires, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.