

N'oubliez pas d'emporter pour chaque dispensation :

- Pièce d'identité
- Carte vitale ou attestation de droits sécurité sociale en cours de validité
- Prise en charge mutuelle

A chaque dispensation, merci de vous munir de l'**original de prescription sécurisée hospitalière valide datant de moins de 3 jours**. Au-delà de 3 jours, votre pharmacien vous délivrera uniquement la quantité de médicament correspondant à la durée restante de votre prescription.

Ma pharmacie : _____

N° de téléphone : _____

Adresse : _____

Mon médecin traitant : _____

N° de téléphone : _____

Adresse : _____

Ce document ne remplace pas la notice de votre médicament que vous devez lire attentivement avant de prendre votre médicament car elle contient des informations complémentaires importantes pour vous.

Fiche réalisée par la Pharmacie Centrale des Hospices Civils de Lyon
Version : Mars 2019



MEDIKINET LM®

5mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg ou 40 mg
gélule à libération modifiée
Chlorhydrate de méthylphénidate

Médicament STUPEFIANT


Prescription limitée à 28 jours

Prescription initiale hospitalière annuelle* réservée
aux spécialistes des centres du sommeil (neurologues,
pédiatres et psychiatres hospitaliers)

Médicament disponible en pharmacie de ville

** La délivrance de ce médicament par votre pharmacien ne peut être réalisée que sur présentation de la prescription initiale hospitalière ou de la prescription d'un autre médecin accompagnée d'une prescription initiale hospitalière datant de moins d'un an. Il est donc important que vous conserviez avec précaution ces documents.*







Qu'est ce que MEDIKINET LM® ? Dans quel cas est il utilisé ?

Le méthylphénidate est indiqué dans les troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité et dans les hypersomnies centrales comme la narcolepsie. 

Comment prendre MEDIKINET LM® ?

Votre dose est adaptée progressivement selon votre besoin.

La prise doit se faire pendant ou après un repas.  

Matin 	Midi 	soir 
	 facultatif	

Votre dose est répartie en une à deux prises par jour.

Les gélules peuvent être ouvertes et leur contenu mélangé avec des aliments (compote par exemple) pour faciliter la prise.

Ne pas écraser, broyer ou croquer les gélules ou leur contenu. 

En cas d'oubli de prise ou de vomissement :

Prenez la dose suivante à l'heure habituelle.

Ne prenez JAMAIS deux fois la dose pour compenser la dose oubliée.

Comment conserver MEDIKINET LP® ?

Conservation à température ambiante (<30°C)

Ne prenez jamais MEDIKINET LP® dans les cas suivants :

- Allergie au méthylphénidate ou à un des autres composants
- Troubles cardiaques préexistant (hypertension artérielle sévère, cardiomyopathie, infarctus du myocarde)
- Troubles psychiatriques : dépression sévère, anorexie, symptômes psychotiques
- Antécédent d'acidité gastrique





La consommation d'alcool est contre-indiquée avec le méthylphénydate (aggravation des effets indésirables)

Grossesse : Méthylphénidate n'est pas recommandé chez les femmes enceintes.

Allaitement : en raison du passage du médicament dans le lait maternel, vous ne devez pas allaiter pendant le traitement.

Demandez TOUJOURS l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien en cas de grossesse ou d'allaitement, **N'arrêtez pas le traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.**

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Classification organique	Type d'effet ressenti	Conduite à tenir
Neuropsychiatrique 	Céphalées, nervosité, irritabilité, insomnie, changement d'humeur	Ne consommez pas d'alcool. Evitez les médicaments pouvant provoquer étourdissements ou confusion. Signalez au médecin tout changement de comportement,
digestifs 	Nausées, vomissements, douleurs abdominales	Buvez entre les repas. Evitez les aliments frits, gras ou épicés. Mangez lentement. Faites plusieurs petits repas légers.
	Diminution de l'appétit	Mangez les aliments que vous aimez et essayez de prendre régulièrement des petits repas.
Cardiaque 	Palpitation, augmentation de la fréquence cardiaque, hypertension	Avertissez votre médecin en cas d'apparition de ces symptômes
métabolique 	Ralentissement de la prise de poids, retard de croissance	Une surveillance régulière doit être mise en place, parlez en à votre médecin (une pause dans le traitement peut être nécessaire)



Si vous ressentez un effet indésirable, qu'il soit précisé ou non dans la notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien

Utilisation d'autres médicaments

Certains médicaments peuvent interagir avec :

- Certains antidépresseurs : moclobémide, iproniazide
- Certains médicaments augmentant la tension artérielle
- Certains médicaments contre les troubles mentaux
- Certains médicaments contre l'épilepsie
- Certains médicaments contre l'acidité de l'estomac

Si vous prenez d'autres médicaments sans ordonnance ou à base de plantes ou compléments alimentaires, parlez en à votre médecin ou à votre pharmacien.